



Рекомендации для населения

Всем гражданам:

- ✓ Вакцинироваться, в том числе повторно против COVID-19 каждые 6 месяцев.
- ✓ При первых респираторных симптомах обращаться к врачу, не заниматься самолечением

Лицам старше 60 лет и/или с сопутствующими заболеваниями:

- ✓ Носить маски или респираторы в общественных местах;
- ✓ Поддерживать в состоянии компенсации (своевременно лечить, не допускать обострения, декомпенсации) имеющиеся хронические заболевания;
- ✓ Вакцинироваться одномоментно против COVID-19 и гриппа;
- ✓ Вакцинироваться против пневмококковой инфекции.
- ✓ При резком ухудшении самочувствия, температуре выше 38,5 вызывать скорую помощь



Рекомендации для медицинских работников

- ❑ Проходить повторную вакцинацию против COVID-19 каждые 6 месяцев.
- ❑ Не пренебрегать средствами индивидуальной защиты при работе с пациентами
- ❑ Обеспечить на подведомственных участках контроль за сроками, прошедшими с даты последней вакцинации против COVID-19 среди лиц старше 60 лет и имеющих хронические сопутствующие заболевания.
- ❑ Активно информировать всех лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания о необходимости вакцинации:

против COVID-19 каждые 6 месяцев;

против гриппа до начала эпидемического сезона (сентябрь – октябрь);

против пневмококковой инфекции.

- ❑ Своевременно отправлять на госпитализацию пациентов, входящих в группы риска
- ❑ Своевременное начало терапии для лечения пациентов с COVID-19 для лечения пациентов старшего возраста, с первых дней.
- ❑ Тщательный сбор анамнеза для предотвращения рисков по возникновению осложнений хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых